

AGRACO

شرکت آگراکو

ریشه در خاک

Catalog 2020-2021





آگراکو، ریشه در خاک

آگراکو با در اولویت قرار دادن کیفیت و انتخاب شرکای تجاری معتبر، مفتخر است که محصولاتی ایده‌آل و با کیفیت تضمین شده را برای سرزمین کهن ایران از سراسر جهان فراهم آورده است، تا ضمن ارتقای بهره‌وری در مصرف نهاده‌های کشاورزی، طلایه دار توسعه کشاورزی پایدار نیز باشد.

به جمع خانواده بزرگ آگراکو خوش آمدید
کارشناسان آگراکو به صورت تخصصی آماده پاسخگویی به سوالات مصرف کنندگان عزیز می باشند. میزان، زمان و نحوه مصرف محصولات با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه، سن گیاه، شدت کمبود و دیگر عوامل متفاوت است، بنابراین جهت حصول نتیجه بهتر توصیه می‌شود قبل از مصرف با کارشناسان آگراکو مشورت نمایید. باقیمانده کودها و سموم کشاورزی خسارات جبران ناپذیری بر کیفیت آب، خاک و سلامت زیست بوم می‌گذارند، به همین دلیل میزان مناسب کود مورد نیاز گیاه و روش صحیح استفاده از آن با کالیبره کردن ابزار آلات مورد استفاده برای هر محصولی اکیدا توصیه می‌شود.

اهداف

از مهمترین اهداف آگراکو تامین نهاده‌های کشاورزی متناسب با اقلیم و آب و خاک ایران می‌باشد. به باور کارشناسان آگراکو، محصول با کیفیت به چیزی فراتر از دانش و تکنولوژی نیاز دارد. در همین راستا آگراکو پس از انجام مطالعات و آزمایشات فنی و دقیق و مشاوره با کارشناسان خبره، نسبت به تامین هر کدام از محصولات خود اقدام می‌نماید.





AGRACO

دسته بندی	نام محصول	ظاهر	برند	صفحه
گل افزا	فلاورینگ	مایع	آگراس	۲۴
رنگ افزا	نوادوس	مایع	نواگرو	۵۹
ریشه افزا	اکتیو روت	مایع	کرسنت	۳۶
	رادیمکس	مایع	نواگرو	۱۴
جلبک دریایی (آلژنیک اسید)	اکتیو آلگا ۲۵	فلیک	کرسنت	۳۷
	آلگامین	مایع	نواگرو	۵۸
اسید هیومیک	فولمکس ۹۰	فلیک	کرسنت	۴۰
	یومیک ۱۸	مایع	نواگرو	۲۰
	هیومی پلاس ۲۰	مایع	آگراس	۳۱
	نواتر	مایع	نواگرو	۲۱
اسید آمینه	نوافول	مایع	نواگرو	۱۰
	بیوکر	مایع	نواگرو	۱۱
	تریپتون	مایع	نواگرو	۱۳
	آمینو ۷ + NPK	مایع	آگراس	۳۲
عناصر ماکرو + میکرو	دکو فورس میکرو	مایع	دکو	۴۶
	دکو سیتروس	پودر	دکو	۵۱
عناصر ماکرو	نورگ ان پلاس	مایع	نواگرو	۱۶
	پُتاس	مایع	آگراس	۲۵
	دکو فوسکی	مایع	دکو	۴۴
NPK	کرسنت NPK	پودر	کرسنت	۴۱
	دکو NPK	پودر	دکو	۵۰
عناصر میکرو	بُر نواگرو	مایع	نواگرو	۱۷
	بُر آگراس	مایع	آگراس	۲۶
	کلات روی ۹/۸	مایع	آگراس	۲۷
	روی و منگنز	مایع	آگراس	۲۸
	میکرو-۱۴۰	مایع	آگراس	۳۰
	دکو میکرو میکس	پودر	دکو	۴۹
کلات آهن ۶% EDDHA	اکتیو آیرون ۶	میکرو گرانول	کرسنت	۳۹
	دکو آیرون ۶	میکرو گرانول	دکو	۴۸
کلسیم	اکتی-کلسیم-منیزیم	مایع	نواگرو	۱۵
	آمینو کلبر	مایع	آگراس	۳۳
	دکو کلسیم	مایع	دکو	۴۷
ضد آفتاب	دکو شیلد	سوسپانسیون	دکو	۴۵





08	Flowering	گل انگیزی
09	Potasio	پتاس مایع
10	Boro-11	بُر ۱۱
11	Zn 9.8	کلات روی ۹/۸
12	Zn+Mn	روی + منگنز
14	Micro-140	میکرو-۱۴۰
15	Humi plus 20	هیومی پلاس ۲۰
16	Amino7 + NPK	آمینو ۷ + کودهای پایه
17	Amino CalBor	آمینو کلبُر



گل افزا

FLOWERING گل انگیزی

افزایش گل انگیزی و عدم ریزش محصول

القای گل انگیزی
بهبود در کیفیت گرده افشانی
استحکام بافت‌های نگهدارنده گل و میوه
تولید محصول با کیفیت به دلیل گرده افشانی مطلوب
حاوی مواد معدنی، اسید آمینه‌های ویژه و مواد محرک
گلدھی
افزایش تعداد میوه در خوشه یا سر شاخه

نیتروژن کل (N)	۶%
فسفر محلول در آب (P_2O_5)	۱۲%
بر محلول در آب (B)	۱%
مولبیدن محلول در آب (OM)	۰/۲%

۱ لیتر (مابع)

ثابت ماده کودی: ۹۶۱۸۴



ملاحظات

- این کود قابلیت اختلاط با NPK را دارد ولی با اسیدهای سنگین مانند سولفوریک، نیتریک و فسفریک اختلاط پذیر نیست.

درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی، پسته)	۱ تا ۱/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب به صورت محلولپاشی در زمان تورم جوانه‌ها و بعد از ریزش گلبرگ‌ها
محصولات زراعی	۲ لیتر در هکتار قبل از رفتن به گل یا خوشه
محصولات جالیزی	۱ تا ۲ لیتر در هکتار در زمان گلدھی
محصولات گلخانه‌ای	۱۰۰ تا ۲۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب در زمان شروع گلدھی

عنصر ماکرو
پتاسیم

POTASIO

پتاس مایع

پیشگیری از کمبود و تامین سریع عنصر
پر مصرف پتاسیم

- افزایش وزن میوه
- فعال کردن اسید آمینه‌های ویژه برای رنگ‌دهی بیشتر
- کنترل روزه‌های برگ
- بهبود مرحله میوه‌نشینی در گیاهان
- پر کردن و خندان کردن دانه‌های پسته



۲۹ %

پتاسیم محلول در آب (K_2O)

۱ لیتر (مایع)

ملاحظات

- این کود قابلیت اختلاط با NPK را دارد ولی با اسیدهای سنگین مانند سولفوریک، نیتریک و فسفریک اختلاط پذیر نیست.

ثبت ماده کودی: ۳۳۳۵۵



درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی، پسته)	۱/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب به صورت محلولپاشی و در صورت لزوم تکرار ۱۵ روز بعد
محصولات زراعی	۱/۵ تا ۲ لیتر در هکتار با تکرار ۱۰ تا ۱۵ روز بعد
محصولات جالبزی	۲ لیتر در هکتار و در صورت نیاز در طول فصل تکرار شود
محصولات گلخانه‌ای	۲۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب و تکرار در طول فصل بسته به تعداد مراحل برداشت هر ۳ تا ۴ برداشت یکبار



عنصر میکرو
بر



BORO-11 بر ۱۱

پیشگیری از کمبود و تامین سریع بر

- از بین رفتن قطعی کمبود عنصر بر
- افزایش مواد قندی و پروتئینی
- بهبود ساختار داخلی میوه
- بهبود گلدهی و تاثیر در رشد بهتر میوه
- جلوگیری از کاهش فتوسنتز و توقف گلدهی
- بهبود گرده افشانی و افزایش تعداد میوه

۱۱ %

عنصر بر کمپلکس شده با اتانول آمین

۱ لیتر (مابع)

ثابت ماده کودی: ۸۵۹۵۱



ملاحظات

- این کود قابلیت اختلاط با NPK را دارد ولی با اسیدهای سنگین مانند سولفوریک، نیتریک و فسفریک اختلاط پذیر نیست.

درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی، پسته)	۱ تا ۱/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب به صورت محلولپاشی در زمان تورم جوانه ها همراه با روی و فلاورینگ
محصولات زراعی و جالیزی	۱ تا ۱/۵ لیتر در هکتار قبل از گل دهی یا رفتن به خوشه
محصولات گلخانه ای	۵۰ تا ۱۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب در طول گلدهی محصول

عنصر میکرو
روی

Zn 9.8 کلات روی ۹/۸

پیشگیری از کمبود و تامین سریع عنصر
روی

- بهبود رشد و ساختارهای استاندارد گیاه
- بهبود کیفیت ظاهری و طعم محصول نهایی
- افزایش موفقیت در کمیت و کیفیت گرده افشانی
- بالابردن فتوسنتز و تولید موثر در گیاه
- افزایش مقاومت گیاه در مقابل بیماری‌ها



% ۹/۸

کلات روی

۱ لیتر (مایع)

ثبت ماده کودی: ۶۳۶۵۳



ملاحظات

- این کود قابلیت اختلاط با NPK را دارد ولی با اسیدهای سنگین مانند سولفوریک، نیتریک و فسفریک اختلاط پذیر نیست.

۱ تا ۱/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب همراه با بُر و فلاورینگ در زمان تورم جوانه‌ها	درختان میوه
۱ تا ۱/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در صورت کمبود روی در طول فصل رشد	(مرکبات، زیتون، سیب، گلابی، پسته)
۱ تا ۲ لیتر در هکتار در طول فصل رشد و همچنین قبل از به گل رفتن یا به خوشه روی	محمولات زراعی و جالیزی
۵۰ تا ۱۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب در طول فصل رشد، برای مقاومت به امراض ویروسی	محمولات گلخانه‌ای
۲ الی ۳ بار تکرار شود.	



عناصر میکرو
روی و منگنز

Zn+Mn روی + منگنز

پیشگیری از کمبود و تامین سریع عناصر
روی و منگنز

- جلوگیری از زردی و رنگ پریدگی برگ‌ها
- جلوگیری از ریزش برگ‌ها خصوصا در سرشاخه‌ها
- کمک به سنتز اسیدهای آمینه
- روی کمپلکس شده با گلوکونیک اسید

روی کمپلکس شده با اسید گلوکونیک	۵%
منگنز	۲/۵%
نیتروژن	۶%

۱ لیتر (مابع)

ثابت ماده کودی: ۲۳۵۷۹



ملاحظات

- این کود قابلیت اختلاط با NPK را دارد ولی با اسیدهای سنگین مانند سولفوریک، نیتریک و فسفریک اختلاط پذیر نیست.

درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی، پسته)	۱ تا ۱/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در ابتدای فصل و تکرار در صورت نیاز در طول فصل رشد
محصولات زراعی و جالبزی	۲ لیتر در هکتار، تکرار در صورت کمبود روی و منگنز در طول فصل رشد
محصولات گلخانه‌ای	۱۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب در طول فصل رشد





عناصر میکرو

MICRO - 140

میکرو - ۱۴۰

تامین سریع عناصر میکرو در طول فصل
رویش

بهینه سازی فرآیندهای رشدی در گیاه
افزایش جذب مواد غذایی از خاک
جلوگیری از بد شکلی و رنگ پریدگی برگها
تولید محصول نهایی با کیفیت و طعم مطلوب
تقویت میوهها و جلوگیری از ریزش میوه



آهن DTPA	۵ %
روی EDTA	۸۵ / ۰ %
منگنز EDTA	۳ %
مس EDTA	۴ / ۰ %
بُر	۳۸ / ۰ %
مولیبدن	۷ / ۰ %

۱ لیتر (مابع)

ثابت ماده کودی: ۰۰۵۴۶



ملاحظات

- از این کود به عنوان کود کامل میکرو می‌توان در کشت هیدرو پونیک نیز استفاده کرد.
- این کود قابلیت اختلاط با NPK را دارد ولی با اسیدهای سنگین مانند سولفوریک، نیتریک و فسفریک اختلاط پذیر نیست.
- از این محصول می‌توان در سیستم آبیاری بارانی و قطره ای استفاده کرد.

درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی، پسته)	۱ تا ۱/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب به صورت محلولپاشی و تکرار ۲ تا ۳ نوبت هر دو هفته یکبار از ابتدای فصل رویش
محصولات زراعی	۱/۵ تا ۲ لیتر در هکتار و تکرار ۱ تا ۲ نوبت در طول فصل رشد
محصولات جالبزی	۱/۵ لیتر در هکتار به صورت محلولپاشی و تکرار ۱ تا ۲ نوبت در طول فصل رشد
محصولات گلخانه‌ای	۱۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب به صورت محلولپاشی و تکرار در طول فصل در صورت نیاز

اسید هیومیک

HUMI PLUS 20

هیومی پلاس ۲۰

هیومات پتاسیم استخراجی از معادن
لئوناردیت به همراه اسید فولویک

توسعه متوازن تر پوشش گیاهی و گل انگیزی بیشتر
بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی و میکروبی خاک
تنظیم فرآیندهای رشد گیاه
افزایش جذب مواد غذایی موجود در خاک
تحریک رشد و فرآیندهای رسیدن، بهبود رنگ و طعم میوه
افزایش خامیت نفوذپذیری خاک
افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک

اسید هیومیک و اسید فولویک کل	۲۰ %
اسید هیومیک (HA)	۱۶ %
اسید فولویک (FA)	۴ %



۵ لیتر (مایع)

ثابت ماده کودی: ۴۱۰۴



ملاحظات

- مقادیر ارائه شده به صورت کلی می باشد و نسبت به شرایط خاک هر منطقه می تواند متفاوت باشد.
- از این محصول می توان در سیستم آبیاری تحت فشار نیز استفاده کرد.
- کود هیومی پلاس با کودهایی که خامیت اسیدی دارند قابلیت اختلاط ندارد.

۱۰ تا ۱۵ لیتر در هکتار در ابتدای شروع فصل و برای تکرار ۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار در هر آبیاری در طول فصل رشد	درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی، پسته)
۵ لیتر در هکتار زمان نشاکاری و برای تکرار ۳ تا ۴ نوبت در طول فصل رشد، هر نوبت ۳ تا ۴ لیتر در هکتار	محصولات زراعی و جالیزی
۰/۵ لیتر در ۱۰۰۰ مترمربع و برای تکرار هر ۱۵ تا ۲۰ روز یکبار همراه با سایر کودهای قابل اختلاط	محصولات گلخانه ای



اسید آمینه

AMINO 7+NPK آمینو ۷ + کودهای پایه

ضد استرس، ترمیم کننده و توسعه
عمومی رشد گیاه

افزایش متابولیسم گیاه
افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماری‌ها، آفات
و استرس‌های محیطی
بهبود کیفیت ظاهری و طعم محصول نهایی
افزایش خاصیت انبارمانی محصول و آسیب کمتر
در حمل و نقل

۱۹ نوع اسید آمینه آزاد	۷٪
نیترژن کل (N)	۵٪
فسفر قابل استفاده (P_2O_5)	۳/۵٪
پتاسیم محلول در آب (K_2O)	۲/۳٪
مواد آبی	۳۵٪

۱ لیتر (مابع)

ثابت ماده کودی: ۴۲۵۷۱



- مقادیر ارائه شده به صورت کلی می‌باشد و نسبت به شرایط خاک هر منطقه می‌تواند متفاوت باشد.
- از این محصول می‌توان در سیستم آبیاری تحت فشار نیز استفاده کرد.

ملاحظات

درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی، پسته)	۱/۵ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب بعد از ریزش گلبرگ‌ها یا در شرایط تنش‌های محیطی
محصولات زراعی	۲ تا ۳ لیتر در هکتار در طول فصل زراعی و تکرار در صورت ایجاد عوامل تنش‌زا
محصولات جالیزی	۲ تا ۳ لیتر در هکتار در طول فصل رشد و تکرار هر ۱۵ تا ۲۰ روز یکبار جهت محافظت گیاهان از عوامل استرس‌زا و تنش‌های محیطی
محصولات گلخانه‌ای	۱۵۰ تا ۲۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب در طول فصل زراعی و بعد از ایجاد عوامل تنش‌زا به خصوص سرمازدگی



AMINO CalBor آمینو کالبر

تامین همزمان کلسیم و بر به همراه
اسید آمینه

- افزایش متابولیسم گیاه
- استحکام بافت‌ها و افزایش تاب‌آوری گیاه در برابر شرایط تنش‌زای محیطی
- بهبود گلدهی و جلوگیری از ریزش گل‌ها
- رنگ‌دهی بهتر در محصول نهایی و افزایش خاصیت انبارمانی
- جلوگیری از لکه پوست استخوانی در پسته

نیتروژن کل (N)	۱۰٪
کلسیم محلول (CaO)	۶/۸٪
بر محلول (B)	۰/۲٪
اسید آمینه آزاد (FAA)	۴٪



۱ لیتر (مایع)

ثبت ماده کودی: ۱۹۴۱۰



ملاحظات

- مقادیر ارائه شده به صورت کلی می‌باشد و نسبت به شرایط خاک هر منطقه می‌تواند متفاوت باشد.
- از این محصول می‌توان در سیستم آبیاری تحت فشار نیز استفاده کرد.

درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی، پسته)	۱ تا ۱/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب به صورت محلولپاشی و تکرار ۲ تا ۳ نوبت بعد از ریزش گلبرگ‌ها به فاصله هر ۱۵ روز
محصولات زراعی و جالیزی	۱ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب به صورت محلولپاشی، ۲ تا ۳ بار در طول فصل رویش
محصولات گلخانه‌ای	۱۵۰ تا ۲۰۰ سی‌سی در ۱۰۰ لیتر آب از زمان گلدهی و تکرار در صورت نیاز هر ۲ تا ۳ هفته یکبار



شرکت اگراکو

مشاوره و تامین کننده نهاده‌های کشاورزی
نماینده انحصاری برندهای مطرح دنیا

تهران، خیابان سهروردی شمالی،
کوچه سینک، پلاک ۱۵
تلفن: ۰۲۱ ۸۸ ۱۷ ۵۱ ۱۳
همراه: ۰۹۱۲ ۹۵ ۹۷ ۱۲۴

agraco.ir
iranagraco
www.agraco.ir